

---

---

**Και ο πιο σημαντικός προγνωστικός δείκτης για την νεφρίτιδα του ΣΕΛ είναι...**

---

---



Δεδομένα από το Euro-Lupus Nephritis Trial όπου η παρουσία **πρωτεϊνουρίας < 0.8g/day 12 μήνες μετά** την τυχαιοποίηση ήταν ο μοναδικός καλύτερος προγνωστικός δείκτης μακροχρόνια καλής νεφρικής λειτουργίας (ευαισθησία=81%, ειδικότητα=78%)

- Η προσθήκη στην πρωτεϊνουρία των επιπέδων κρεατινίνης ορού δεν βελτίωσε την επίδοση
- Η προσθήκη RBC ούρων μείωσε σημαντικά την ευαισθησία στο 47% και άρα συνιστάται να αποφεύγεται στο μέλλον η προσθήκη αυτού του παράγοντα στα κλινικά κριτήρια απόκρισης

*Predictors of long-term renal outcome in Lupus Nephritis Trials: Lessons learned from the Euro-Lupus Nephritis Cohort. Maria Dall'Era, Miriam Cisternas, Dawn Smilek, Laura Straub, Frederic Houssiau, Ricard Cervera, Brad Rovin and Meggan Mackay. Accepted manuscript online: 20 JAN 2015 11:46AM EST | DOI: 10.1002/art.39026*

**ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΑ :**

[FDA έγκριση Secukinumab \(injectable interleukin-17A inhibitor, Cosentyx \) για την ψωρίαση](#)

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο  
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης  
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη