



Θετικοποίηση μεθόδων screening για TB υπό αντι-TNF-α !

Annals of the
RHEUMATIC DISEASES
The EULAR Journal

70 ασθενείς με διάφορα ρευματικά νοσήματα (PA, SpA κα) και αρνητικό αρχικά έλεγχο για TB (TST, T-SPOT.TB, QuantiFERON-TB Gold In Tube (QFT-GIT), α/α θώρακα) αντιμετώπιστηκαν με αντι-TNF-α αγωγή και επανελέχθησαν 1 χρόνο μετά

- 20 ασθενείς (**29%**) παρουσίασαν αλλαγή σε κάποια από τις μεθόδους ασυμπτωματικού ελέγχου : TST σε 9 (13%), T-SPOT.TB σε 7 (10%) και QFT-GIT σε 5 ασθενείς (7%)
- Μόνο ένας ασθενής είχε θετικοποίηση συγχρόνως σε 2 μεθόδους
- Από τους βιολογικούς παράγοντες, μόνο το infliximab σχετίστηκε με μειωμένη συχνότητα θετικοποίησης
- Κανένας ασθενής δεν ανέπτυξε TB, το 40% όμως αυτών έλαβαν ισονιαζίδη

*Frequent conversion of tuberculosis screening tests during anti-tumour necrosis factor therapy in patients with rheumatic diseases. Chrisoula Hatzara, Emilia Hadziyannis, Anna Kandili, Christos Koutsianas, Anastasia Makris, Georgios Georgiopoulos, **Dimitrios Vassilopoulos**. Ann Rheum Dis doi:10.1136/annrheumdis-2014-205376. Published Online First **22 May 2014***

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη