

Ψυχιατρικές διαταραχές μετά από στεροειδή στον ΣΕΛ



Προοπτική παρακολούθηση 8 εβδομάδων, 139 επεισοδίων έξαρσης ΣΕΛ (χωρίς συμμετοχή ΚΝΣ) από 135 ασθενείς με ΣΕΛ, επεισόδια για τα οποία οι ασθενείς έλαβαν κορτικοστεροειδή

- **Η θεραπεία με κορτικοστεροειδή μπορεί να πυροδοτήσει νέα ψυχιατρικά συμβάματα**, αφού από τα 139 επεισόδια, διαπιστώθηκαν 20 (14.4 %) νέα
- Η μέση δόση κορτικοστεροειδών ήταν 0.98 (0.24-1.39 mg/kg/day) πρεδνιζόνης
- Από τα 20 αυτά νέα επεισόδια, τα 14 θα μπορούσαν να ταξινομηθούν ως διαταραχές επαγόμενες από κορτικοστεροειδή (*CIPDs: corticosteroid-induced psychiatric disorders*), συνοδεύονταν δε από διαταραχές συναισθήματος σε 13 περιπτώσεις (κατάθλιψη 2, μανία 9, συνδυασμός 2) και ψυχωσική διαταραχή σε μια περίπτωση
- Στις περιπτώσεις οι οποίες παρουσιάστηκαν με παραλήρημα, έγινε με βάση τα ευρήματα διάγνωση ΣΕΛ-ΚΝΣ νόσος και αντιμετωπίστηκαν με αύξηση της ανοσοκατασταλτικής αγωγής
- Για τα υπόλοιπα 4 περιστατικά, δεν ήταν δυνατό να γίνει αιτιολογική εξήγηση

New-onset psychiatric disorders after corticosteroid therapy in systemic lupus erythematosus: an observational case-series study. Nishimura K1, Omori M, Sato E, Katsumata Y, Gono T, Kawaguchi Y, Harigai M, Yamanaka H, Ishigooka J. J Neurol. 2014 Aug 21. [Epub ahead of print]

Το κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση της περίληψης της δημοσιευμένης μελέτης και δεν περιέχει στοιχεία από το πλήρες άρθρο
Αποτελεί επίσης εύρημα μιας μόνο εργασίας και όχι υποχρεωτικά θέμα κατασταλαγμένης γνώσης
Αποτελεί τέλος βιβλιογραφική ενημέρωση και όχι απαραίτητα σύσταση για την καθημέρα κλινική πράξη